

Hindi Canlı Herpes Virüs Suşu HVT/NDV-F

BİLEŞİMİ

Kümes hayvanlarında Marek Hastalığı ve Newcastle hastalığına karşı hindi Herpes virüs suşu HVT/NDV-F içeren canlı hücre ile ilişkili aşı. En az 1810 PFU/kuş dozu canlı herpes virüs suşu HVT/NDV-F içerir.

ENDİKASYONLAR

Marek Hastalığı ve Newcastle hastalığının önlenmesinde yardımcı ajan olarak sağlıklı 18 günlük tavuk embriyolarının yumurta içi yolla veya bir günlük civcivlerin deri altı yolla aşılması için önerilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ VE YOLU/YOLLARI

Deri altı (subkutan) enjeksiyon
Yumurta içi (in ovo) enjeksiyon

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

AMPULLER - Dolu sıvı azot kabında saklanır.

SEYRELTİCİ - Oda sıcaklığında saklanır (15-25°C).

KAP - Sıvı azot kabını kuluçkahanedeki kuluçka/tavuk bölümünden ayrılmış temiz, kuru ve iyi havalandırılan bir odada, dik konumda saklayınız.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır.

TİCARİ TAKDİM SEKİ

1000, 2000, 3000, 4000 veya 5000 dozluk şişelerde

ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARI

İnkübatör giriş ağızları ve tavuk kutularından uzakta, temiz, kuru ve iyi havalandırılmış bir alanda dik konumda saklayınız.

Sıvı azot düzeyini muhafaza ediniz.

KONTRENDİKASYONLAR

Klinik olarak hasta veya stres altındaki kuşları aşılamayınız.

YASAL ARINMA SÜRESİ

21 gündür

ATIK VE KULLANILMAYAN ÜRÜNLERİN İMHASI

Yerel mevzuatlara uygun olarak uzaklaştırılır.

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR Innovax ND



Dondurulmuş Hücre Süspansiyonu
Veteriner Aşı

2000 DOZ

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 15.09.2015

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat: 13 34394
Levent/İstanbul-Türkiye

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

Intervet Inc. 29610 Intervet Lane
PO Box 318, Millsboro, Delaware 19966-0318
Amerika Birleşik Devletleri



1023

Hindi Canlı Herpes Virüs Suşu HVT/NDV-F

En az 1810 PFU/kuş dozu canlı herpes virüs suşu HVT/NDV-F içerir.

BİLEŞİMİ

Kümes hayvanlarında Marek Hastalığı ve Newcastle hastalığına karşı hindi Herpes virüs suşu HVT/NDV-F içeren canlı hücre ile ilişkili aşı.

ENDİKASYONLAR

Marek Hastalığı ve Newcastle hastalığının önlenmesinde yardımcı ajan olarak sağlıklı 18 günlük tavuk embriyolarının yumurta içi (in ovo) yolla veya bir günlük civcivlerin deri altı (subkutan) yolla aşılanması için önerilir.

KONTRENDİKASYONLAR

Klinik olarak hasta veya stres altındaki kuşları aşılamayınız.

YAN ETKİLER

Yoktur

HEDEF TÜRLER

Tavuklar

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aşımla hazırlanması

Aşılama ekipmanını suya 20 dk kaynatarak veya otoklavda (121 °C'de 15 dakika) sterilize ediniz.

Kimyasal dezenfektanlar kullanmayınız.

1. Tekli veya kombine hücre ile ilişkili Marek aşısının hazırlanmasında CA seyreltici kullanınız. Deri altı enjeksiyon için, tavuk başına 0.2 ml enjektöre etmek üzere her 1000 aşı dozu için 200 ml CA seyreltici kullanınız. Yumurtaların yumurta içi aşılanması için, yumurta başına 0.05 ml enjektöre etmek üzere her 10000 aşı dozu için 500 ml CA seyreltici kullanınız. Seyreltici berrak, kırmızı renkli, çökeltilsiz, ve karıştırma sırasında oda sıcaklığında (15-25°C) olmalıdır.
2. Aşısı sıvı azot kabından almadan önce, ellerinizi eldivenlerle koruyunuz, uzun önlük giyiniz ve yüz maskesi ya da koruyucu gözlük kullanınız. Şeritten bir ampul çıkarırken eldivenli elinizin avuç kısmını vücudunuzdan ve yüzünüzden uzakta tutunuz.
3. Ampulleri içeren şeridi sıvı azot kabındaki kutudan alırken yalnızca hemen kullanılacak ampul(ler) dışarı çıkarılmaldır. Biz bir kerede yalnızca maksimum 5 ampulü(bir şerit) kullanmasını öneririz. Gereken ampul(ler) çıkarıldıktan sonra kalan ampuller derhal sıvı azot kabındaki kutuya geri yerleştirilmelidir.
4. Ampul(ler)in içeriği 25-27°C'deki temiz suya daldırılarak hızlı buzlarından arındırılır. İçeriklerin dağılması için ampulleri yavaşça döndürünüz. Buzları çözüldükten sonra hücrelerin korunması için aşılama seyreltici ile olabildiğince çabuk karıştırılması önemlidir. Ampulü kurulumuz ardından ampulü boyun kısmından kırınız ve derhal aşağıdaki şekilde ilerleyiniz.
5. Ampul içeriğini 18 gauge iğne takılmış steril bir enjektöre yavaşça çekiniz.
6. İğneyi seyreltici torbasının tıpasından geçirin ve enjektör içeriğini yavaşça ve hafifçe seyrelticiye aktarınız. Aşığı karıştırmak için torbayı yavaşça döndürerek alt-üst ediniz. Seyreltinin bir kısmını ampulü durulamak üzere enjektöre çekiniz. Yıkanan materyali ampulden tekrar çekiniz ve yavaşça seyreltici torbasına enjektöre ediniz. Enjektörü çıkartınız ve aşığı karıştırmak üzere torbayı alt-üst ediniz (6-8 kez).
7. Şimdi aşı kullanımına hazırdır.

ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI

Aşı enjeksiyonla uygulanır.

Deri altı aşılama için her bir civcive boyundan 0.2 ml enjektöre edilir.

Yumurta içi aşılama için embriyo gelişiminin 18. gününde her bir yumurtaya 0.05 ml enjektöre edilir. Aşılama sırasında aşı torbası sık sık yavaşça döndürülmelidir.

Derhal kullanılmıyorsa kırık buz üzerinde saklanmalıdır. Karıştırma işleminden sonraki 2 saat içinde torbanın tüm içeriği kullanılmalıdır. Bu süreden sonra kalan aşı atılmaldır.

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR

Innovax ND



Dondurulmuş Hücre Süspansiyonu

Veteriner Aşı

YASAL ARINMA SÜRESİ

21 gündür

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1000, 2000, 3000, 4000 veya 5000 dozluk şişelerde

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

AMPULLER - Dolu sıvı azot kabında saklanır.

SEYRELTİCİ - Oda sıcaklığında saklanır (15-25 °C).

KAP - Sıvı azot kabını kuluçkahanedeki kuluçka/tavuk bölümünden ayrılmış temiz, kuru ve iyi havalandırılan bir odada, dik konumda saklayınız.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır.

UYARILAR

1. Bu aşıyla herhangi bir maddeyi karıştırmayınız.
2. Ampuller ve kullanılmayan tüm içeriği yoktur.
3. Aşı ampulünü aşılamaya hazır alana dek sıvı azot içinde dondurulmuş halde saklayınız.
4. Kullanımdan hemen önceyi haricinde buzları çözülmüş aşığı kullanmayınız. Doğru saklama ve tasımının kontrolü amacıyla ampuller sıvı azot kaplarını içerisine bas aşağı yerleştirilir. Donmuş haldaki aşı ampulün uç kısmında duruyorsa bu aşımın buzlarının önceden çözülmüş olduğunu gösterir ve kesinlikle kullanılmamalıdır.
5. Intervet Nobilis Rismovac (Rispenis CVL-988), Nobilis ND C2, Nobilis ND Clone 30 veya Bursa hastalığı aşısı 89/03 haricinde diğer aşılarda eş zamanlı kullanımın güvenlik ve etkinliğine ilişkin bilgi yoktur.
6. Klasik HVT suşu içeren başka bir aşı veya herhangi bir HVT rekombinant aşısıyla birlikte kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sıvı azot kabı ve aşı yalnızca uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından, sıvı azot ve çok düşük sıcaklıktaki materyallerin muamelesine ilişkin güvenlik önlemleri dikkate alınarak kullanılmalıdır. Ellerin, yüzün ve giysilerin aşıyla kontaminasyonunu önlemek için özen gösterilmelidir.

ATIK VE KULLANILMAYAN ÜRÜNLERİN İHMASI

Yerel mevzuata uygun şekilde uzaklaştırılır.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 15.09.2015



1023