

Nobilis® AE+POX



**SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA
KULLANILIR
LIYOFİLİZE PELET
VETERİNER AŞI**



BİLEŞİMİ

Nobilis AE+POX liyofilize bir aşıdır. Her doz, AE virüsü Calnek suşundan en az 2.5 log₁₀ EID₅₀ ve kanatlı çiçeği virüsü Gibbs suşundan 2.8 log₁₀ EID₅₀ içerir. Aşı peleti, stabilizerler ve gentamisin içerir. Pakette, birinde aşılardan olduğu şişelerle diğesinde steril diluent (UNISOLVE) bulunan iki ünite mevcuttur.

ENDİKASYONLAR

Gelecekte ticari yumurtacı ve damızlık olarak kullanılacak yarkaları, Avian encephalomyelitis (AE) ve kanatlı çiçeği hastalıklarına karşı korumak amacıyla kullanılır. Aşılansmış hayvanlar AE sebebi ile oluşabilecek yumurta verimi düşüklüklerinden üretim dönemi boyunca korunmuş olurlar. Ayrıca bu aşı ile aşılansmış hayvanların civcivleri de maternal antikorlar sebebi ile AE'ye karşı ilk birkaç hafta korunurlar.

UYGULAMA ŞEKLİ

Göğüse yakın kanat bölgesinden aplikatör yardımı ile aşığı uygulayınız.

AŞININ HAZIRLANMASI

Bir şişe aşı ile bir şişe diluent kullanımdan hemen önce karıştırılır. Aşı iğnesi aşının içerisine daldırılıp çıkarılır, aşının uygulanacağı bölgedeki tüyler uzaklaştırılır daha sonra kanadın göğüse yakın bölgesinden iğne batırılır.

Aşılansmadan 7-10 gün sonra, birkaç tavuk aşının "alımıyla" ilgili olarak kontrol edilmelidir. Aşılama bölgesindeki deri kabarması ve kabuk bağlama alımın işaretleridir. Kabuklar aşılansmadan 2-3 hafta sonra düşerler. Tam bağışıklık aşılansmadan 3 hafta sonra gelişir.

ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI

Tavuklar 8-16 hafta içinde aşılansmalıdır.

Hindiler 18-26 hafta içinde aşılansmalıdır

YASAL ARINMA SÜRESİ

Yoktur

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE UYARILAR

- Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır. Hastalık belirtileri görünmese de Koksidiozis, Mycoplasma enfeksiyonları, Marek hastalığı ve diğer hastalıkların varlığı, komplikasyonların ortaya çıkmasına ya da immunité oluşumunun yavaşlamasına sebep olabilir.
- Aynı işletme içerisinde bulunan hastalığa karşı duyarlı tüm hayvanlar aynı zamanda aşılanmalıdır.
- Bir hayvana bir dozun altında aşı yapmayınız.
- Yumurtlama dönemi süresince veya yumurtaya girmesine 4 haftadan az süre kalmış yarkalara uygulanmamalıdır.
- 8 haftadan genç civcivlere ve 18 haftadan genç hindilere aşılama yapmayınız.
- Boş veya kısmen kullanılmış şişeleri yakarak imha ediniz.

MUHAFAZA ŞARTLARI

2-8 C'de dondurulmadan saklanmalıdır

İMALATÇI FIRMA

Intervet International
Wim de Körverstraat 35
P.O Box 31
5830 AA Boxmeer
The Netherlands

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ

Intervet Veteriner İlaçları
Büyükdere cad. No:127 Astoria Kuleleri B blok Kat:8 34394 Esentepe, İstanbul

G.T.H.B.İği Pazarlama İzin Tarih ve No:
14.12.2010-047173

