

# Nobilis® CORYZA



Sadece Hayvan Sağlığında kullanılır



Enjeksiyonluk Süspansiyon  
Veteriner Aşısı

## BİLEŞİMİ

Aktif bileşenler: Her doz aşıda, *Avibacterium paragallinarum* suş 083 (serotip A), Spross (serotip B) ve H18 suşları (serotip C)'den en az 1 CPD70 içerir. Aktif bileşenler, sulu saponin adjuvanı içinde süspansiyon edilmiştir.

## ENDİKASYONLAR

Aşısı, *Avibacterium paragallinarum* enfeksiyonlarından korunmak amacıyla uygulanır.

## ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI

Tavuklar 10 haftalıktan itibaren aşılanabilir. Damızlık ve yumurtacılar da aşılama üzerinden 52 haftaya kadar varan bağışıklık elde edilebilmesi için 2 aşılama gereklidir. İlk aşılama 10-12. haftalarda, ikinci aşılama da yumurtaya girmeden birkaç hafta önce yapılmalıdır. İki aşılama arasında en az 4 hafta geçmelidir.

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Her bir tavuğa 0.25 ml kas içi uygulanır.

## AŞI REAKSİYONLARI

Sağlıklı hayvanlarda hiçbir anormal klinik reaksiyon gözlenmez. Aşısı müteakip birkaç hafta süren geçici bir şişkinlik gözlenebilir.

## YASAL ARINMA SÜRESİ

Yoktur

## UYARILAR

- Yalnız sağlıklı hayvanları aşılayınız
- Aşısı kullanılmadan önce ısısının 15-25 dereceye gelmesini bekleyiniz
- Şişeyi, kullanılmadan önce kuvvetlice ve kullanım esnasında da aralıklarla çalkalayınız
- Steril enjeksiyon ekipmanı kullanınız
- Açıldıktan sonra şişe içeriğinin tamamı kullanılmalıdır

## MUHAFAZA ŞARTLARI

2-8 °C'de dondurulmadan saklanmalıdır.  
Açılan şişeler 3 saat içinde kullanılmalıdır.

## ATIK MATERYALLERİN İMHA ŞARTLARI

Ulusal mevzuat şartlarına uygun olarak imha edilir.

## TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

250 ml aşısı içeren 1000 dozluk şişeler.

**İMALATÇI FIRMA**

Intervet International. Wim de Körverstraat 35  
P.O Box:31  
5830 AA Boxmeer  
The Netherlands

**İTHALATÇI FIRMA**

Intervet Veteriner İlaçları Limited Şirketi.  
Büyükdere cad. No.127 Astroria Kuleleri  
B blok Kat:8 34394.  
Esentepe-İstanbul/TÜRKİYE

**Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı**  
**Pazarlama izin tarih ve no: 14.12.2010-047179**

