

Nobilis

GUMBORO 228E



Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Liyofilize pelet
Veteriner Aşı



BİLEŞİMİ

Nobilis Gumboro 228E, Enfeksiyöz Bursal Hastalığa (Gumboro) karşı kullanılan, embriyolu yumurtada geliştirilmiş, canlı ve liyofilize bir aşıdır. Her bir doz en az 2,0 log₁₀EID₅₀ Gumboro virüsü 228E suşunu içerir. Aşı peleti stabilizerler ve gentamisin içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Gumboro hastalığına karşı tavuklarda bağışıklık sağlamak amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Aşı içme suyuna katılarak uygulanabilir. Aşı, hayvanların yaklaşık 2 saat içinde tüketeceği su içinde çözündürülür.

ÖNERİLEN AŞILAMA PROGRAMI

Aşı virüs suşu olan 228E, daha az attenüe edilmiş orta IBDV suşudur. Tavukların başarılı bir şekilde aşılanabilecekleri yaş, maternal antikor seviyesine ve bundan dolayı tavuklara ve parent damızlık sürünün aşılanma yoluna bağlıdır.

Prensipler:

1. Sadece canlı Gumboro aşlarıyla aşılanmış parent sürüden elde edilen broilerler 7-14. günden itibaren aşılanabilirler.
2. Sadece inaktif Gumboro aşlarıyla aşılanmış parent sürüden elde edilen broilerler 14-17. günden itibaren aşılanabilirler.
3. Sadece canlı Gumboro aşlarıyla aşılanmış parent sürülerden elde edilen yumurtacı sürünün aşılanması 14-21. günden itibaren gerçekleştirilebilir.
4. Canlı ve inaktif Gumboro aşları ile aşılanmış parent sürülerden elde edilen yumurtacı sürünün aşılanması 21-28. günden itibaren gerçekleştirilebilir.

Yukarıda belirtilen zaman periyotlarında; yavrulardaki maternal antikor seviyeleri Nobilis Gumboro 228E ile başarılı bir şekilde aşılanma yapılmasına olanak sağlayacak şekilde yeterince azaltılmıştır, fakat saha virüsüyle oluşabilecek enfeksiyona karşı korumak için hala yeterince yüksektir.

BAĞIŞIKLIK

Antikor yanıtı aşılamadan 1 hafta sonra görülür.

AŞI REAKSİYONLARI

Sağlıklı tavukların aşılanmasından sonra aşılanma sonrası reaksiyonlar gözlenmez.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Yoktur

UYARILAR

- Aşılardan sonra ellerinizi ve ekipmanları yıkayarak dezenfekte ediniz. Artık aşılar yakılarak ya da kaynatılarak imha edilmelidir.
- Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
- Şişe açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI

2-8 °C'de karanlık ortamda saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

500, 1000, 2500, 5000 ya da 10000 doz içeren 10 şişelik karton kutularda.

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Büyükdere cad. No.127 Astoria Kuleleri B blok Kat:8 34394 Esentepe/İstanbul

ÜRETİCİ FIRMA ADI VE ADRESİ

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31 5830 AA
Boxmeer, Hollanda

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pazarlama izin tarih ve no: 14.12.2010-047187



MSD

Animal Health