

Nobilis® MG 6/85



LIYOFİLİZE PELET
VETERİNER AŞI



SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR

BİLEŞİMİ

Stabilizatör içinde, her bir doz en az 10^{6.9} CFU canlı zayıflatılmış *Mycoplasma gallisepticum* MG 6/85 suşu içermektedir.

ENDİKASYONLARI

Yumurta ya girmemiş, genç yumurtacı tavukların, *Mycoplasma gallisepticum* enfeksiyonunun klinik belirtilerini azaltmak üzere aktif bağışıklık sağlamak için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aerosol uygulama için su ile sulandırıldıktan sonra aşı 6 haftalık ya da daha yaşlı yarıklara her bir hayvan için en az 10^{6.9} CFU (1 doz) olarak uygulanır.

DOĞRU UYGULAMA İÇİN TAVSİYELER

Bir çiftlik ya da kanatlı kompleksi için bir aşılama programı belirlemek için çok sayıda faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Aşılamının etkili olması için aşı iyi bakım-idare altında, uygun çevre koşullarında barındırılan sağlıklı hayvanlara aerosol yolla uygulanmalıdır. İhtiyaç duyulan bağışıklığın seviyesi operasyonel uygulamalar ve mikroba maruz kalma seviyesine göre farklılık gösterecektir.

Aşının hazırlanması

Aşı, su içinde çözüldükten sonra iki saat içinde kullanılmalıdır.

1. Temiz, soğuk, klorlanmamış su kullanılmalıdır.
2. Şişe su içinde açılır.
3. Koparılabilir mühür ve kapak flakondan çıkarılır.
4. Aşırı sprey yolla uygulamak için gerekli miktarda aşı suya (1000 kanatlı başına 400 ml ±) eklenir.

İnce sprey uygulaması

1. Sprey aşılama, 20 mikrondan küçük damlacıklı ince sprey ile olmalıdır.
2. Sprey cihazında herhangi bir dezenfektan ya da kaymağı alınmış süt kullanılmaz.
3. Sprey cihazı sadece aşıların uygulanması için kullanılmalıdır. Kullanıldıktan sonra iyice temizlenmelidir.
4. Sprey aşılaması yapılırken tüm fanlar ve hava girişleri kapatılmalıdır.
5. Sprey cihazı üreticisinin su hacmine ilişkin önerileri göz önünde bulundurulmalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

- Bu aşı, yumurta üretiminin başlangıcından önceki 4 hafta süresince ve yumurta üretimi başladıktan sonra uygulanmaz.
- Bu aşı, solunum sistemi hastalıklarına (örneğin Newcastle hastalığı, bronşit vb.) karşı herhangi bir canlı aşılamadan sonraki 2 hafta içinde uygulanmamalıdır.
- Diğer aşılarından 14 gün önce ve 14 gün sonra uygulamamalıdır.

YAN ETKİLERİ

Yoktur

YASAL ARINMA SÜRESİ

Sıfır gün

MUHAFAZA ŞARTLARI

2-8 °C'de karanlık ortamda muhafaza edilmelidir. Dondurulmaz.

DAMIZLIKLARDA KULLANILMASI YASAKTIR

NOTLAR

- Yalnızca sağlıklı yarıkları aşılayınız.
- Aynı kümesteki tüm duyarlı yarıklar aynı zamanda aşılanmalıdır.
- Aşılamadan 5 gün öncesinde ve aşılamadan sonraki 2 hafta içerisinde, yarıklara antibakteriyel ilaçlar, özellikle antimikoplazma etkili ilaçlar vermeyiniz.
- Aşılama sırasında ve reaksiyon dönemi boyunca stres koşullarını azaltmaya çalışınız.
- Aşırı herhangi başka bir maddeyle karıştırmayınız.
- Bu aşırı seyreltmemeniz ya da dozajı genişletmemeniz.
- Açıldığında içeriğin tamamını kullanınız.
- Kısmen kullanılmış aşıları daha sonra kullanmak için saklamayınız ve açılmış ve/veya sulandırılmış aşının tamamını kullanınız.
- Aşılama yaparken gözler, eller ve giysilerle temastan kaçınılması iyi aşılama uygulamasının gereğidir.
- Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

500, 1000, 2000 dozluk liyofilize aşı içeren 20 ml'lik flakonlar halinde satılmaktadır.

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Büyükdere cad. No. 127 Astoria Kuleleri B blok Kat:8 34394 Esentepe/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31 5830 AA
Boxmeer, Hollanda

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzin Tarihi ve No:
B.12.0.KKG.0.19/108-02-17-4348
/07.12.2010-045933

