

# Nobilis® RT+IB MULTI+G+ND



Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır



## Bileşimi

Tavukların; Avian Rhinotrakeitis virüsü, Enfeksiyöz Bronşit virüsü, Newcastle Hastalığı virüsü ve Enfeksiyöz Bursa Hastalığı virüsüne karşı korunmaları için kombine inaktif aşidir. Nobilis RT+IB multi+G+ND bir immünojenik Avian rhinotrakeiti virüs suşu (ARTV), iki immünojenik Enfeksiyöz bronşit virüs suşu (IBV), bir immünojenik Enfeksiyöz Bursal hastalığı virüs suşu (IBDV) ve bir immünojenik Newcastle hastalığı virüs suşu (NDV) içerir. I.B. komponenti, Massachusetts tipi suş ve D274 tipine ait varyant bir suş içerir. Virüsler inaktive edilmiş ve yağ adjuvant emülsiyonun su fazı içinde süspansne edilmiştir.

## Endikasyonları

Aşısı; damızlık çiftliklerinin, Enfeksiyöz Bronşit virüsünün Massachusetts ve D274/D207 serotiplerine ve Newcastle hastalığı virüsüne karşı; Avian Rhinotrakeitis virüs enfeksiyonunun ters etkilerine karşı korunması ve aşılınmış kanatlıların soylarında Gumboro Hastalığı'na karşı en azından yaşamlarının ilk haftalarında anneden gelecek antikolar sağlayarak korunmaları için önerilmektedir.

Antijenler; uzatılmış bir immünite stimülasyonu sağlamak için emülsiyon şeklinde hazırlanmıştır.

## Kontrendikasyonları

Bildirilmemiştir.

## Önerilen aşı programı

Nobilis RT + IBmulti + G + ND kanatlılara 14-20 haftalık civarında, ancak yumurtlama başlangıcından en az 4 hafta önce uygulanmalıdır.

Optimal bir rapel etkisi için, kanatlılara Enfeksiyöz Bronşit, Avian Rinotrakeiti, Newcastle Hastalığı ve Enfeksiyöz Bursa Hastalığına karşı canlı aşılarla primer aşı uygulaması yapılmalıdır.

En iyi sonuçlar, inaktif aşı ile aşılama, canlı primer aşı uygulanmasından en az 4 hafta sonra yapıldığında elde edilecektir

## Kullanım şekli

Her bir kanatlıya 0.5 ml aşı kalça veya göğüs kasından intramüsküler olarak ya da boyunun arka kısmından subkutan olarak uygulanmalıdır.

## Atık materyallerin imha şartları

Ulusal mevzuat şartlarına uygun olarak imha edilir.

## Uyarı

- Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız.
- Aşığı kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyiniz. (15-25 °C)
- Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.
- Açılmış şişeler 3 saat içinde kullanılmalıdır.
- Diğer aşılarla karıştırmayınız.

- Ürünün yanlışlıkla uygulayıcıya ya da yanındaki kişiye enjekte edilmesi halinde; derhal bir doktora başvurulmalı ve aşının yağ içinde su emülsiyonu olarak hazırlandığı belirtilmelidir.

**Yasal arınma süresi**

Yok.

**Muhafaza koşulları**

2-8 °C arasında saklanmalıdır; dondurulmamalıdır

**Ticari takdim şekli**

1000 doz için yeterli 500 ml içeren şişeler.

**Pazarlama İzin Sahibi Adı ve Adresi:**

Intervet Veteriner İlaçları  
Büyükdere cad. No.127 Astoria Kuleleri  
B blok Kat:8 34394 Esentepe  
İstanbul

**Üretici Firma:**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
P.O. Box 31 5830 AA  
Boxmeer, Hollanda

**Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı**  
**Pazarlama izin tarihi ve no: 14.12.2010-047177**

